



Пневмококк - самая частая причина инфекций верхних и нижних дыхательных путей, сепсиса и менингита у детей.

Пневмококковая пневмония является наиболее часто встречающейся формой воспаления легких у детей в возрасте до 5 лет. **Ежегодно в мире 1млн детей в этом возрасте погибает от пневмонии.**

Возбудителем пневмококковой инфекции является бактерия пневмококк (*Streptococcus pneumoniae*). Распространение возбудителя происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, а также при контакте с предметами, которые соприкасались со слюной больного (чашки, ложки, игрушки).

Как защититься от пневмококковой инфекции?

С 2014года в национальный календарь профилактических прививок введена обязательная прививка против пневмококковой инфекции.

Схемы вакцинации против пневмококковой инфекции:

с 2месяцев жизни рекомендована двукратная вакцинация в 2 месяца и в 4,5 месяца, ревакцинацию проводят в 15 месяцев

с 3 до 11 месяцев жизни рекомендована двукратная вакцинация с интервалом не менее месяца между введениями, ревакцинация проводится на втором году жизни

с 12 до 23 месяцев жизни рекомендована двукратная вакцинация с интервалом между введениями не менее 2-х месяцев

с 2 до 5 лет однократная вакцинация.

Какие вакцины против пневмококковой инфекции разрешены к применению в РФ.

Для вакцинации детей с 2 месяцев жизни разрешено применение вакцины **Превенар 13**

Для вакцинации детей с 2 лет - вакцина

Пневмо 23