



Дезоморфин – впервые был синтезирован как средство замещающее морфин. Ученые хотели синтезировать заменитель морфина с большим обезболивающим эффектом и не вызывающим зависимость, частично им это удалось! Дезоморфин при исследованиях на животных вызывал более сильное обезболивание, чем морфин (в 10 раз сильнее), однако по времени обезболивание длилось всего 4 часа, а вот наркотическая зависимость развивалась очень быстро. Для дезоморфина характерно:

б

ыстрое развитие зависимости, сильное токсическое действие на организм, разрушение организма

. Именно из-за таких последствий дезоморфин не нашел широкого применения в медицине. В состав дезоморфина входят бензин, йод, бытовые растворители, серная кислота и другие растворители, содержащие большое количество примесей (например в бензине примеси тяжелых металлов) из-за этого приготовленный дезоморфин особо токсичен и способен после

первой

же

инъекции

вызывать различные

тромбофлебиты, воспаления сосудов и других органов.

Последствия употребления дезоморфина

Дезоморфин второй по популярности наркотик в России после героина, это объясняется дешевизной изготовления дезоморфина и доступностью препаратов для его производства. Как уже упоминалось выше, дезоморфин способен уже после первых уколов вызывать сильную зависимость, а те условия и препараты, которые

используются для приготовления дезоморфина делают его крайне токсичным. Для большинства наркоманов дезоморфин становится **первым и последним наркотиком** в их

жизни

. Наркоманы дали прозвище дезоморфину –

«крокодил»

. Крокодилом его называли за способность быстро вызывать глубокий некроз тканей и воспаление вен, вследствие чего кожа становится как бы покрытой чешуёй и начинает быстро отторгаться. Тело наркомана употребляющего дезоморфин покрыто язвами в местах уколов. Дезоморфин очень быстро и сильно снижает иммунитет наркомана, а та гадость, которая входит в состав дезоморфина закупоривает просветы сосудов, разносится кровью и оседает в каждом органе. На фоне сниженного иммунитета начинают образоваться абсцессы внутренних органов, тело гниет не только снаружи, но и изнутри. От наркомана начинает исходить

трупно-лекарственный запах

. Зависимость от дезоморфина развивается после одной-двух инъекций, средний

срок жизни наркомана

употребляющего дезоморфин,

не более 2 лет

. Я видел дезоморфинового наркомана (стаж 1 месяц) у которого развился абсцесс лобной доли мозга. Врачи прооперировали его, удалили абсцесс, но получить лечение он не смог до конца, так как на 2 день началась ломка и он сбежал. Жить ему осталось не много. У наркоманов употребляющих дезоморфин очень быстро развивается тромбофлебит (закупорка и воспаление сосудов) конечностей, из-за чего в конечности перестает поступать кровь и питательные вещества. Конечность быстро иссыхает, приобретает коричневый цвет, покрывается кровоточащими язвами и всё это в конечном итоге ведет к ампутации. Наркоманы прекрасно видят как на их теле возникают все новые и новые язвы, но зависимость заставляет их искать вены в других частях тела, и, в конце концов, они сплошь покрываются чешуей и язвами.

Наркоманы, употребляющие дезоморфин в течение 6 месяцев (**живые трупы**), уже не поддаются лечению вообще, врачи могут лишь продлить жизнь на небольшое время, да и жизнью это назвать нельзя. Постоянная ломка заставит наркомана сбежать и найти дозу. Необратимые изменения в организме начинаются уже через один месяц после употребления дезоморфина, но их еще возможно приостановить при условии полного отказа от дезоморфина.

Смерть от передозировки дезоморфина довольно частое явление. **Средний возраст наркомана**

употребляющего дезоморфин –

24 года

. Наркоманы употребляющие дезоморфин живут меньше героиновых наркоманов, которые в среднем живут по 5 лет. С 2005 года в больницы стали поступать наркоманы для которых дезоморфин оказался их первым и последним наркотиком. Большинство наркоманов употребляющих дезоморфин погибают от мультиорганной патологии (поражены все органы наркомана). Ампутации конечностей у наркоманов употребляющих дезоморфин довольно частое явление, их вынуждены делать врачи в попытке хоть как-то спасти конечность. Гепатит С встречается практически у каждого

наркомана употребляющего дезоморфин. Шанс самостоятельно соскочить с иглы равен нулю.^^